

PREPARACIÓN BIOPSIA DE PRÓSTATA

MEDICACIÓN NECESARIA:

Enema Casen 250cc. 2 envases.
Ciprofloxacino 500 mg comprimidos.
Metronidazol 250mg. comprimidos (FLAGYL).

En caso de alergia puede sustituir Ciprofloxacino y Metronidazol por Monurol 3gr. 1 sobre 4 horas antes
DOSIS ÚNICA.

Si está con tratamiento anticoagulante:

Aspirinas, Tromalyt, Disgren: dejarlo 3 días antes de la prueba.

Plavix, Iscover, Ticlid: dejarlo 7 días antes de la prueba.

Sintrom: pasar previamente por el servicio de Hematología de su centro.

Anticoagulantes orales: consultar con su médico.

DÍA ANTERIOR A LA PRUEBA:

Por la noche se pondrá un Enema Casen de 250cc.

DÍA DE LA PRUEBA:

Tratamiento antibiótico:

- **Ciprofloxacino 500 mg 1 comprimido cada 8 horas.**
- **Metronidazol 250mg. 2 comprimidos cada 12 horas.**

Iniciar ambos tratamientos 4 horas antes de la cita **CON MUY POCA AGUA** (un sorbo pequeño)

No comer, ni beber nada desde 6 horas antes de la exploración.

Al levantarse se pondrá un Enema Casen de 250cc.

Deberá aportar pruebas de coagulación (Protrombina y Cefalina).

DESPUÉS DE LA PRUEBA:

Tratamiento antibiótico:

- **Ciprofloxacino 500 mg 1 comprimido cada 8 horas. Tres días más.**
- **Metronidazol 250mg. 2 comprimidos cada 12 horas. Un día más.**

- Evitar el reposo absoluto.
- Dieta normal al salir de la Clínica.
- Acudir acompañados.
- Si molestias o dolor: Ibuprofeno 600 mgrs cada 12 horas.
- Es normal el sangrado rectal y por la orina durante los 2 primeros días. En caso de persistencia, o sangrado no controlado así como fiebre superior a 38º acudir a urgencias o llamar al teléfono de atención urgente de nuestro centro.
- Es normal la persistencia de semen negro u oscuro a los 7 días tras biopsia de próstata.
- En caso de surgir algún problema llamar al 902 20 22 30 al Servicio de Urgencias.