



FT- Q-PREP-0006c
FT- Q-PREP-0015c – Revisió Març 2020 – Direcció Mèdica

PREPARACIÓ RADIOLOGIA CONTRASTADA (Enema i Pielografia)

MEDICACIÓ NECESSÀRIA:

PLEINVUE® • C.N. 721059-7

DOS DIES ABANS DE LA PROVA:

Seguirà una dieta pobre en residus:

POT PRENDRE	NO POT PENDRE
Llet i iogurt desnatats, mantega o margarina (en poca quantitat) Formatges frescos. Pa blanc o torrat. Galetes sense fibra. Carns i peixos blancs (a la planxa o bullits). Patates en puré o cuites. Pasta "italiana" o arròs (sense salsa). Sucs sense polpa (colats). Begudes sense gas. Cafè, te i infusions lleugeres. Ous. Brous filtrats. Codony, préssec en almívar, poma o pera cuita sense pell.	Productes integrals. Fruita, verdura, llegums, amanides. Carns grasses, embotits. Xocolata, pastissos, pastisseria industrial. Fruits secs. Aliments cuinats com salses. Estofats. Llet sencera. Begudes amb gas. Melmelada. Peix o marisc en salsa. Alcohol.

DIA ABANS DE LA PROVA:

SI LI HAN DONAT CITA AL MATÍ:

DOSI 1 : 19 hores - ha de beure ½ litre de PLEINVUE®, un got cada 15-20 minuts. **IMPORTANT:** Després de l'últim got, heu de beure, com a mínim ½ LITRE DE LÍQUIDS CLARS (tes, infusions).



DOSI 2 : 22 hores - ha de beure ½ litre de PLEINVUE®, un got cada 15-20 minuts. **IMPORTANT:** Després de l'últim got, heu de beure, com a mínim ½ LITRE DE LÍQUIDS CLARS (tes, infusions).

SI LI HAN DONAT CITA A LA TARDA:

DIA ABANS DE LA PROVA - DOSI 1 : 20 hores- ha de beure ½ litre de PLEINVUE®, un got cada 15-20 minuts. **IMPORTANT:** Després del últim got, també heu de beure, com a mínim ½ LITRE DE LÍQUIDS CLARS (tes, infusions).

DIA DE LA PROVA - DOSI 2 : 9:30 hores- ha de beure ½ litre de PLEINVUE®, un got cada 15-20 minuts. **IMPORTANT:** Després del últim got, també heu de beure, com a mínim ½ LITRE DE LÍQUIDS CLARS (tes, infusions).

COM PREPARAR PLEINVUE®:

COM PREPARAR PLEINVUE®	
 DOSI 1 Obriu el sobre corresponent a la Dosi 1 , i dissolgueu-ne el contingut en 500 ml d'aigua freda . Prengueu-vos el preparat lentament, durant uns 40-45 minuts. Es recomana un got cada 15-20 min (125 ml). A continuació, preneu 1/2 litre de líquids clars.	 DOSI 2 Obriu el sobre corresponent a la Dosi 2 (sobre A + sobre B) y dissolgueu-ne el contingut dels 2 sobres en 500 ml d'aigua freda . Prengueu-vos el preparat lentament, durant uns 40-45 minuts. Es recomana un got cada 15-20 min (125 ml). A continuació, preneu 1/2 litre de líquids clars.

NO MENJAR RES DURANT LA PREPARACIÓ FINS DESPRÉS DE L'EXPLORACIÓ.

DIA DE LA PROVA:

Haurà de venir en dejú de 4 hores de dejú (ni prendre ni sòlids ni líquids).
Si es diabètic, comunicu-ho al tècnic.